



Amarilis

Hippeastrum × hybridum

El bulbo más teatral que cultivamos. Cada uno llega con su flor ya construida por dentro, y el mismo bulbo volverá a florecer durante años.

El año que viene

Conserva cada hoja tras florecer: reconstruyen el bulbo

PLENO SOL

TEMPERATURA AMBIENTE

VUELVE A FLORECER

FÁCIL DE CUIDAR

DÍA A DÍA

Luz

Amante del sol: al menos cuatro horas de sol directo al día. Una ventana al sur es lo mejor; al este o al oeste es aceptable. Gira la maceta cada pocos días o el tallo se inclinará hacia el vidrio.

Riego

Riega a fondo una vez al plantarlo y luego espera alrededor de una semana. Después mantén el sustrato ligeramente húmedo, más o menos semanalmente, subiendo a una o dos veces por semana en flor. Nunca eches agua sobre el cuello del bulbo, donde puede quedarse y pudrirlo, y vacía siempre el plato.

Abono

No abones un bulbo recién plantado y sin hojas: quema las raíces nuevas. Cuando aparezcan las hojas, dos veces al mes con fertilizante líquido para plantas de interior.

Temperatura

Cálido, 21–24 °C / 70–75 °F, hasta que arranquen raíces y brotes. Cuando las flores abran, llévalo a la habitación más fresca que tengas, alrededor de 18 °C / 65 °F y fuera del sol directo, y durarán bastante más.

Humedad

No necesita humedad especial.

CUANDO TERMINAN LAS FLORES

Este bulbo vuelve a florecer durante años si lo dejas recargarse. Corta cada flor al marchitarse y, cuando se vaya la última, corta el tallo justo por encima del cuello del bulbo, pero conserva todas las hojas. Cultívalo como planta de interior en una ventana soleada toda la primavera y el verano, regando y abonando: las hojas reconstruyen el bulbo. Después dale descanso: suspende agua y abono durante 8–10 semanas, deja que las hojas amarilleen y se retiren, y mantén el bulbo alrededor de 13 °C / 55 °F. Cuando asome un botón nuevo, corta el follaje seco, retoma el riego y devuélvelo al sol.

SI ALGO NO SE VE BIEN

Bulbo blando, café y con mal olor

Se acumuló agua en el cuello del bulbo. Fácil de evitar: riega el sustrato alrededor, deja drenar la maceta y vacía el plato.

Muchas hojas pero ninguna flor

El bulbo no tuvo un descanso adecuado, o pasó el verano anterior demasiado oscuro y sin alimento, y no pudo construir el botón floral.

Vetas o manchas rojas en tallo y bulbo

Mancha roja (Stagonospora). Descarta los bulbos muy afectados.

Vetas amarillas permanentes en las hojas

Virus del mosaico. No tiene cura: descártalo.

REFERENCIA PARA PRODUCTORES

Datos de producción y terminación. Si tienes esta planta en una ventana de tu casa, todo lo que necesitas está en la página uno — esta página es para el sector.

pH del sustrato	6,0–6,5. Evitar la corteza de pino en la mezcla.
EC del sustrato	No establecida en la bibliografía publicada.
Sustrato	Medio esterilizado, grueso, bien drenado y rico en materia orgánica; partes iguales de turba y perlita funciona bien, y algunos productores añaden arena como lastre. Maceta estándar de 15 cm con drenaje.
Fertilización	Fertilidad baja, 75–150 ppm N. La vara floral ya viene preformada dentro del bulbo, así que el exceso de nitrógeno solo empuja follaje a costa de la floración. Empezar solo cuando arranque el crecimiento, con fertilizante de liberación controlada de varios meses o NPK líquido cada 2–4 semanas.
Luz	No establecida numéricamente. La luz alta y brillante produce los tallos más cortos y la mejor calidad de flor; a gran altitud a veces conviene un sombreado parcial.
Temperatura	21–24 °C / 70–75 °F hasta el enraizamiento y la emergencia foliar, luego 18–24 °C / 65–75 °F durante el crecimiento. En flor, 16–18 °C / 60–65 °F alarga la vida de la flor. Almacenamiento de bulbo 13–23 °C / 55–73 °F en húmedo, o 20–25 °C / 68–77 °F en seco.
Humedad relativa	No establecida.
Riego	Saturar una vez con agua tibia en la plantación y mantener después ligeramente húmedo, aproximadamente semanal, regando de nuevo solo si el medio se seca antes del crecimiento activo. No permitir que el agua se acumule en el centro del bulbo. El exceso de riego antes del establecimiento radicular es el principal problema de producción.
Fotoperiodo	No es fotoperiódica. La vara se preforma durante el ciclo anterior y el forzado se conduce por temperatura; la floración ocurre de 4 a 8 semanas después de iniciar el crecimiento.

DESÓRDENES Y PLAGAS

Exceso de riego y pudrición de bulbo y raíz (principal problema de producción), *Stagonospora curtisii* (fuego o mancha roja), virus del mosaico. Ácaros, trips, cochinilla algodonosa. La uniformidad de altura es un problema recurrente en terminación; se han investigado remojos de bulbo con reguladores antes de plantar.

CULTIVADO POR

Boekestyn Greenhouses Inc.

2085 Fourth Ave, St. Catharines, Ontario L2R 6P9, Canadá
 boekestyngreenhouses.com · hello@boekestyngreenhouses.com
 Tres generaciones de cultivo familiar desde 1962.

Toda amarilis se vende con su flor ya dentro: la vara se forma durante el ciclo de crecimiento anterior, por eso un bulbo seco no necesita luz alguna para florecer y por eso abonar de más un bulbo forzado te da hojas en lugar de flores.

Fuentes

- NC State Extension, Home forcing of potted amaryllis
- GPN, Cybister amaryllis; Cornell flowerbulbs