Lirio de Pascua

Lilium longiflorum

Nuestro cultivo insignia, y por el que más se nos conoce. Una temporada corta y espectacular dentro de casa y una larga vida en el jardín después.

Truco de florista Retira las anteras al abrir cada botón y duran más

LUZ INDIRECTA · AMBIENTE FRESCO · PARA PLANTAR AFUERA

DÍA A DÍA

Luz	Luz brillante pero indirecta: cerca de una ventana, no al sol directo. Lejos de corrientes de aire, puertas abiertas y rejillas de calefacción.
Riego	Riega cuando la superficie se sienta seca, a fondo, hasta que salga agua por abajo. Quita la funda metalizada o hazle agujeros: un lirio con el agua atrapada se pudre en pocos días.
Abono	No hace falta mientras florece. Si piensas plantarlo afuera después, abónalo una vez al mes con fertilizante diluido cuando termine la floración.
Temperatura	Cuanto más fresco, mejor: 16–21 °C / 60–70 °F de día con noches algo más frescas mantiene las flores abiertas mucho más tiempo.
Humedad	Humedad interior corriente. Un buen movimiento de aire ayuda a prevenir el moho gris sobre los pétalos.

CUANDO TERMINAN LAS FLORES

A medida que cada botón abre, retira las anteras amarillas antes de que suelten polen: alarga la vida de cada flor y mantiene el polen lejos de los muebles. Pellizca cada flor donde se une al tallo cuando se marchite. Dentro de casa no volverá a florecer, pero afuera vive durante años: consérvalo en una ventana soleada hasta que pase el riesgo de helada, acostúmbralo gradualmente durante seis o siete días de la sombra al pleno sol, y planta el bulbo a 15 cm de profundidad y 30–45 cm de separación en suelo bien drenado a pleno sol. Deja que el follaje viejo amarillee antes de cortarlo y acolcha bien para el invierno. Afuera se asienta en una floración natural de julio y agosto, y vuelve con más fuerza cada año.

SI ALGO NO SE VE BIEN

Hojas bajas amarilleando de abajo hacia arriba	Casi siempre una maceta que retiene agua. Quita la funda metalizada o hazle agujeros, vacía el plato y deja secar la superficie antes de volver a regar.
Manchas grises y cafés vellosas en pétalos y hojas	Botrytis por aire húmedo y estancado. Aumenta la circulación de aire y evita salpicar las flores.
Los botones se arrugan y no abren	Habitación demasiado cálida o sol directo. Llévalo a un sitio más fresco y fuera de la luz directa.
Manchas de polen en la ropa	Retira las anteras a medida que cada flor abre. Es lo que hacen los floristas, y además mantiene las flores más tiempo.

REFERENCIA PARA PRODUCTORES

Datos de producción y terminación. Si tienes esta planta en una ventana de tu casa, todo lo que necesitas está en la página uno — esta página es para el sector.

pH del sustrato	6,2–6,5, más alto que en la mayoría de los cultivos de invernadero.
EC del sustrato	No permitir que la EC del sustrato supere 3,0–3,5 mS/cm SME. Las sales solubles altas dañan la raíz; aplicar un riego de lavado claro antes del despacho.
Sustrato	Mezcla de maceta bien drenada. Crítico: sin superfosfato y sin perlita, ambos fuentes de flúor, y el flúor provoca quemado foliar en Lilium.
Fertilización	200–250 ppm N en fertirriego constante desde la emergencia del brote, con 15-0-15 o una mezcla 3:2 de nitrato de calcio y nitrato de potasio. Alternar con 20-10-20 solo si el medio está libre de fósforo. No superar 200 ppm salvo que un análisis lo indique; bajar a 100 ppm cuando los botones se pongan blancos y suspender en los 7 días previos a la venta. El nitrato de calcio corrige el quemado foliar.
Luz	No establecida específicamente para L. longiflorum. Sombrear de inmediato al sacar de cámara fría; iluminación de seguridad solo cuando el enfriamiento del bulbo fue incompleto. Los lirios híbridos de maceta comparables se cultivan a 2.500 f.c.
Temperatura	15,5–16,7 °C / 60–62 °F día y noche durante toda la iniciación floral, manteniéndose por debajo de 18,3 °C / 65 °F hasta completarla. Después la temperatura media diaria es la palanca de calendario: 21–24 °C / 70–75 °F para acelerar, 13–16 °C / 55–60 °F para frenar. La mejor calidad de terminación a 14–16 °C / 58–60 °F.
Humedad relativa	No establecida. La guía es cualitativa: evitar el follaje mojado prolongado y el aire estancado.
Riego	Humedad constante sin excesos. No retener agua ni fertilizante para frenar el desarrollo: usar la temperatura. Un riego claro antes del despacho para lavar sales.
Fotoperiodo	No fotoperiódica en sentido comercial: la iniciación se conduce por vernalización del bulbo (cámara fría controlada) y temperatura de forzado. La iluminación de día largo es solo un recurso de rescate.

DESÓRDENES Y PLAGAS

Amarilleo de hojas bajas (asociado al uso de reguladores, estrés radicular y duración de la cámara fría; se corrige con productos GA4+7 a 10/10 ppm a inicio de temporada o 100/100 ppm dentro de los 14 días previos a la venta). Quemado foliar inducido por flúor. Botrytis, pudrición basal por Fusarium, Pythium, Rhizoctonia. Virus del mosaico del pepino. Los ácaros del bulbo y los esciáridos aumentan el riesgo de pudrición radicular; trips y pulgón en estado de botón. Control de altura por DIF negativo o descenso térmico matinal, A-Rest, Sumagic 2,5–5 ppm o Topflor en drench a 0,25 ppm a 7–10 cm.

CULTIVADO POR

Boekestyn Greenhouses Inc.
2085 Fourth Ave, St. Catharines, Ontario L2R 6P9, Canadá
boekestyngreenhouses.com · hello@boekestyngreenhouses.com
Tres generaciones de cultivo familiar desde 1962.

Originario de Taiwán y de las islas Ryukyu de Japón, que abastecieron casi todos los bulbos de Norteamérica hasta que Pearl Harbor cortó el comercio; hoy casi todos los bulbos de lirio de Pascua que se venden aquí se cultivan en una franja estrecha de tierras bajas costeras entre el noroeste de California y el suroeste de Oregón.

Fuentes

- UConn IPM, Easter Lily Schedule
- UMass Extension; Griffin Greenhouse Supplies