



Prímula

Primula obconica

Semanas de color denso y luminoso en una planta compacta. La habitación más fresca de la casa es la que hace que dure más.

Duración Quita las flores marchitas seguido y florece semanas más

LUZ INDIRECTA

AMBIENTE FRESCO

LARGA DURACIÓN

DÍA A DÍA

Luz	Luz brillante pero indirecta: una ventana al norte o al este, o algo retirada de una ventana soleada. El sol directo del mediodía quema las hojas tiernas.
Riego	Riega a fondo cada vez que la superficie se sienta seca y deja drenar. Se marchita rápido y de forma dramática si se seca, y marchitarse varias veces acorta la floración. No la dejes en un plato lleno de agua.
Abono	No hace falta durante las semanas que está en flor. Si quieres, un fertilizante equilibrado a media dosis dos veces al mes.
Temperatura	13–21 °C / 55–70 °F. Cada flor dura bastante más en el extremo fresco. En una sala cálida el espectáculo se consume en una o dos semanas.
Humedad	Moderada. Evita el aire caliente y seco de radiadores y rejillas de calefacción. No rocíes las flores: los pétalos mojados se manchan y enmohecen.

CUANDO TERMINAN LAS FLORES

La prímula es una planta de temporada, en su mejor momento durante las semanas que está en flor, así que disfrútala a fondo en lugar de intentar conservarla: dentro de casa no vuelve a florecer. Mantenerla en la habitación más fresca y retirar las flores gastadas es lo que más alarga el espectáculo. No resiste el invierno canadiense, así que tampoco puede pasar al jardín.

SI ALGO NO SE VE BIEN

Marchitez total y repentina	La maceta se secó. Un buen riego suele recuperarla una vez, pero marchitarse repetidamente acorta el espectáculo.
Pelusa gris sobre las flores marchitas	Botrytis por pétalos mojados, follaje amontonado y aire quieto. Retira las flores gastadas a tiempo.

REFERENCIA PARA PRODUCTORES

Datos de producción y terminación. Si tienes esta planta en una ventana de tu casa, todo lo que necesitas está en la página uno — esta página es para el sector.

pH del sustrato	5,5–5,8 (ficha de cultivo de Syngenta para <i>P. obconica</i>). Los tipos acaulis/vulgaris van más alto, 5,8–6,2 en plug.
EC del sustrato	0,5–0,75 mS/cm en plug y ~1,0 en crecimiento. La fuente no indica el método de extracción: confírmalo contra tu propia línea base.
Sustrato	Sustrato fino de turba, bien drenado y libre de patógenos, para un cultivo de raíz superficial. Cubierta ligera opcional de vermiculita en la siembra.
Fertilización	Plug 50 ppm N con un 14-4-14 a base de calcio. Crecimiento 100–150 ppm N con la misma formulación, en fertirriego constante. Evitar N amoniacal alto y picos de sales en este sistema radicular superficial.
Luz	Germinación 10–100 f.c. mejora la uniformidad. Engorde de plug máximo 3.000 f.c. / 30.000 lux. Floración: los días largos de 16 h a ~875 f.c. son los más eficientes; los días cortos de 8 h retrasan o impiden la floración. DLI no establecido.
Temperatura	Germinación 22–24 °C / 72–75 °F y luego 18–20 °C / 65–68 °F. Crecimiento: noche 16–18 °C / 60–65 °F tras el trasplante, bajando a 10–13 °C / 50–55 °F una vez enraizada; día 16–21 °C / 60–70 °F.
Humedad relativa	100 % hasta la emergencia de la radícula y luego 40–70 %. El movimiento horizontal de aire es imprescindible una vez que el follaje cubre la maceta.
Riego	Saturado los días 0–5, húmedo los días 6–18 y medio a partir del día 19; después alternar húmedo y medio. Mantener secos el follaje y la corona: subirrigación, manta capilar o goteo por encima de la aspersión, porque el Botrytis es la principal pérdida en terminación.

DESÓRDENES Y PLAGAS

Virus del bronceado del tomate (TSWV, transmitido por trips). Pudrición radicular por *Pythium* en sustrato frío y húmedo. Botrytis sobre follaje amontonado y flores gastadas. Mosca blanca, minadores, pulgón, trips, esciáridos. Salud laboral: la primina causa dermatitis alérgica de contacto; usar guantes o cultivares libres de primina. Ciclo total de cultivo 16–20 semanas.

CULTIVADO POR

Bokeestyn Greenhouses Inc.

2085 Fourth Ave, St. Catharines, Ontario L2R 6P9, Canadá

bokeestyngreenhouses.com · hello@bokeestyngreenhouses.com

Tres generaciones de cultivo familiar desde 1962.

Fue la causa más común de dermatitis por plantas en Gran Bretaña hasta los años sesenta, lo que llevó a los mejoradores a perseguir durante décadas variedades libres de primina; la primera salió al mercado en 1995.

Fuentes

- Syngenta Flowers, Primula obconica culture sheet
- DermNet NZ — Primula dermatitis